

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

**1. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE ÉS CÍME, VALAMINT AZ EEA TERÜLETÉN A KÉSZTERMÉK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS GYÁRTÓ NEVE ÉS CÍME, HA NEM AZONOS AZ ELŐBBIVEL**

Engedélyes és gyártó:  
LAVET Gyógyszergyártó és Szolgáltató Kft.  
1161 Budapest, Ottó u. 14.



**2. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY NEVE**  
Vetrisulf pulvis A.U.V.

**3. HATÓANYAGOK MEGNEVEZÉSE**

Szulfaklórpiridazin-Na	500,0 mg/g
Trimetoprim	100,0 mg/g

**4. JAVALLATOK**

Idült légzőszervi betegség (CRD), colibacillosis, baromfikolera, pulyka bordetellosis, haemophilus-nátha, salmonellosis, erysipelothrix-fertőzés, staphylococcosis, elhalásos bélgyulladás gyógykezelésére.

**5. ELLENJAVALLATOK**

Nem alkalmazható a készítmény hatóanyagaival, vagy bármely segédanyaggal vagy vivőanyaggal szembeni túlérzékenység esetén.

**6. MELLÉKHATÁSOK**

A készítménnyel végzett céllat-tolerancia vizsgálatokban mellékhatásokat még háromszoros adagban történő alkalmazás esetén sem tapasztaltak. Amennyiben feltételezett mellékhatások jelentkeznek, a készítmény adagolását abba kell hagyni és a tüneteket mutató állatokat szükség esetén tünetileg kell kezelni.

**7. CÉLÁLLAT FAJOK**

Házityúk, pulyka, házilúd

**8. ADAGOLÁS CÉLÁLLAT FAJONKÉNT**

Általános adag: 40 mg Vetrisulf pulvis/ttkg/nap (24 mg hatóanyag/ttkg/nap), ivóvízben oldva vagy egyedi kezelésre a takarmányba keverten, 3-5 napon át.

**9. FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT**

Alkalmazás: A készítményt folyamatos itatás formájában alkalmazzuk. A szükséges koncentrációt a kezelendő állatsoport testtömege és aktuális ivóvízfelvétele alapján határozzuk meg. A készítmény 1000 l ivóvízhez keverendő napi mennyiségét mindhárom célállatfajra vonatkozóan az alábbi általános útmutató szemlélteti:

- \* 7 napos korig: 100 g/1000 liter
- \* 1-4 hetes korban: 200 g/1000 liter
- \* 4 hetesenél idősebb korban: 300 g/1000 liter

A kezelés időtartama alatt a medikált ivóvíz kizárólagos ivóvízforrásként szolgál. A gyógyszeres ivóvizet naponta frissen kell elkészíteni.

**10. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ**

Házityúk, pulyka, házilúd: 2 nap  
Étkezési tojást termelő tojóállatoknak nem adható.

**11. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK**

**Az állatgyógyászati készítményt gyermekek elől gondosan el kell zárni!**  
Eredeti csomagolásban legfeljebb 25° hőmérsékleten, száraz helyen, fénytől védve tárolandó.

**Lejárató idő:** 2 év.

A tartály felbontása utáni lejárati idő: 3 hónap  
Ivóvízben történt feloldás utáni lejárati idő: 24 óra.

**12. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉS(EK)**

**Túladagolás**

A Vetrisulf pulvis granulátum tolerancia vizsgálata során nemkívánatos hatások a terápiás adag háromszorosának történő alkalmazásakor sem jelentkeztek. Amennyiben nagyfokú túladagolás következtében toxikus tünetek lépnek fel, a kezelést abba kell hagyni, és a tüneteket mutató állatokat szükség szerint tünetileg kell kezelni.

**Az állatok kezelésére vonatkozó különleges óvintézkedések**

A készítmény bekeverése során kerülni kell annak bőrre vagy nyálkahártyára kerülését, illetve belélegzését. A bőrre vagy szembe jutott készítményt bő vízzel le kell mosni.

**13. A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKÁNAK KEZELÉSÉRE, MEGSEMISÍTÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK**

A fel nem használt állatgyógyászati készítményt, valamint az állatgyógyászati készítményekből származó hulladékanyagokat a helyi hatósági követelményeknek megfelelően kell megsemmisíteni.

**14. A HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA**

2006. december 1.

**15. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK**

**Kiszerelési egységek**

100 g-os és 1 kg-os polipropilén tartály, polipropilén tetővel és LDPE tasakkal

A készítménnyel kapcsolatos további információért forduljon a forgalomba hozatali engedély jogosultjához.